
Blootstellingen negatief geassocieerd met het risico op niercelcarcinoom
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Schattingen	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
CAROTENOÏDEN				
Zeaxanthine	2	781,129	2,616	*0.79 (0.67-0.93)*
Luteïne	4	879,626	3,623	*0.80 (0.70-0.91)*
Bètacaroteen	5	881,922	4,765	*0.98 (0.70-1.36)*
VITAMINEN A, C, D, E EN K				
Vitamine E	4	127,855	2,404	*0.67 (0.46-0.99)*
Vitamine C	5	128,222	2,559	*0.76 (0.62-0.94)*
B-VITAMINEN				
Vitamine B1	2	4,597	1,909	*0.72 (0.55-0.92)*
POLYFENOLEN EN FLAVONOÏDEN				
Thee	3	777,802	2,495	*0.65 (0.43-0.98)*
OVERIG				
Alcohol	15	2,782,705	21,572	*0.71 (0.63-0.80)*
Totale inname van voedingsvezels	2	4,410	1,621	*0.85 (0.65-1.12)*



RR < 1 = negatief geassocieerd met het risico op niercelcarcinoom. |◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) |◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) |◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen | pijlpunt = interval loopt door buiten de as

Include subexposures: No