
# 与肾细胞癌风险呈正相关的暴露因素
# 膳食摄入研究的荟萃分析

| 暴露因素 | 估计值数 | 样本量 | 病例数 | 合并 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| 类胡萝卜素 | | | | |
| 番茄红素 | 3 | 873,444 | 2,860 | 1.02 (0.73-1.41) |
| 维生素 A、C、D、E、K | | | | |
| 维生素 A | 2 | 4,597 | 1,909 | 1.22 (0.53-2.80) |
| B 族维生素 | | | | |
| 叶酸 | 3 | 129,691 | 2,345 | 1.04 (0.70-1.54) |
| 代谢物与氨基酸 | | | | |
| 膳食蛋白质摄入量 | 2 | 776,349 | 2,168 | 1.30 (0.76-2.22) |
| 其他 | | | | |
| 加工肉类摄入量 | 3 | 497,805 | 1,843 | 1.37 (0.75-2.52) |
| 红肉 | 4 | 986,845 | 3,043 | 1.76 (1.22-2.54) |
| 乳制品 | 3 | 3,506 | 1,009 | 2.79 (1.24-6.32) |




暴露类别

类胡萝卜素　维生素 A、C、D、E、K　B 族维生素　代谢物与氨基酸　其他

RR > 1 = 与肾细胞癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No