
與腎細胞癌風險呈正相關的暴露因子
膳食攝取研究的統合分析

暴露因子	估計值數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
茄紅素	3	873,444	2,860	1.02 (0.73–1.41)
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 A	2	4,597	1,909	1.22 (0.53–2.80)
B 群維生素				
葉酸	3	129,691	2,345	1.04 (0.70–1.54)
代謝物與胺基酸				
膳食蛋白質攝取量	2	776,349	2,168	1.30 (0.76–2.22)
其他				
加工肉類攝取量	3	497,805	1,843	1.37 (0.75–2.52)
紅肉	4	986,845	3,043	1.76 (1.22–2.54)
乳製品	3	3,506	1,009	2.79 (1.24–6.32)



暴露類別
類胡蘿蔔素　維生素 A、C、D、E、K　B 群維生素　代謝物與胺基酸　其他

RR > 1 = 與腎細胞癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No