
與膀胱癌風險呈負相關的暴露因子

暴露因子	估計值數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
葉黃素	2	1,969	940	0.52 (0.32–0.82)
β-胡蘿蔔素	2	57,269	1,178	0.70 (0.45–1.08)
茄紅素	2	101,940	858	0.95 (0.90–0.99)
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 D	8	15,511	3,156	0.60 (0.46–0.79)
維生素 C	2	4,359	831	0.68 (0.44–1.07)
維生素 E	2	1,785	754	0.70 (0.50–0.98)
B 群維生素				
葉酸	2	2,508	1,233	0.65 (0.36–1.17)
維生素 B1	3	403,230	1,548	0.97 (0.87–1.08)
礦物質與微量元素				
硒	7	161,335	3,086	0.76 (0.56–1.03)
水果與蔬菜				
豆類	2	2,541	1,268	0.64 (0.43–0.95)
酪梨	2	112,328	1,165	0.78 (0.60–1.01)
發酵食品與益生菌				
優格	2	101,981	906	0.65 (0.25–1.65)
發酵食品	3	203,114	2,164	0.66 (0.55–0.80)
脂肪酸與脂質				
Omega-3 脂肪酸	2	1,061	572	0.31 (0.20–0.48)
其他				
全穀物攝取量	2	1,486	678	0.55 (0.23–1.33)
乳製品	8	306,953	3,788	0.74 (0.54–1.01)
總膳食纖維攝取量	2	676,447	3,990	0.85 (0.77–0.95)
酒精	6	490,657	5,696	0.91 (0.77–1.08)



RR < 1 = 與膀胱癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊

Include subexposures: No