
與腎細胞癌風險呈負相關的暴露因子

暴露因子	估計值數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
玉米黃素	2	781,129	2,616	0.79 (0.67–0.93)
葉黃素	4	879,626	3,623	0.80 (0.70–0.91)
β-胡蘿蔔素	5	881,922	4,765	0.98 (0.70–1.36)
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 E	4	127,855	2,404	0.67 (0.46–0.99)
維生素 D	5	123,196	2,132	0.75 (0.54–1.03)
維生素 C	5	128,222	2,559	0.76 (0.62–0.94)
B 群維生素				
維生素 B12	2	1,959	730	0.63 (0.47–0.86)
維生素 B1	2	4,597	1,909	0.72 (0.55–0.92)
維生素 B6	3	3,861	1,547	0.75 (0.40–1.40)
葉酸	6	132,098	3,299	0.77 (0.52–1.15)
維生素 B2	3	3,861	1,547	0.84 (0.68–1.04)
礦物質與微量元素				
硒	2	3,471	1,543	0.53 (0.04–6.94)
多酚與類黃酮				
茶	3	777,802	2,495	0.65 (0.43–0.98)
其他				
酒精	15	2,782,705	21,572	0.71 (0.63–0.80)
總膳食纖維攝取量	2	4,410	1,621	0.85 (0.65–1.12)



RR < 1 = 與腎細胞癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No