
신세포암 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인
식이 섭취 연구의 메타분석

노출 요인	추정치 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
라이코펜	3	873,444	2,860	1.02 (0.73–1.41)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 A	2	4,597	1,909	1.22 (0.53–2.80)
비타민 B군				
엽산	3	129,691	2,345	1.04 (0.70–1.54)
대사산물 및 아미노산				
식이 단백질 섭취	2	776,349	2,168	1.30 (0.76–2.22)
기타				
가공육 섭취	3	497,805	1,843	1.37 (0.75–2.52)
붉은 고기	4	986,845	3,043	1.76 (1.22–2.54)
유제품	3	3,506	1,009	2.79 (1.24–6.32)



노출 요인군
카로티노이드 비타민 A, C, D, E, K 비타민 B군 대사산물 및 아미노산 기타

RR > 1 = 신세포암 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: Yes