
방광암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인

노출 요인	추정치 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
루테인	2	1,969	940	0.52 (0.32–0.82)
베타-카로틴	2	57,269	1,178	0.70 (0.45–1.08)
라이코펜	2	101,940	858	0.95 (0.90–0.99)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 D	8	15,511	3,156	0.60 (0.46–0.79)
비타민 C	2	4,359	831	0.68 (0.44–1.07)
비타민 E	2	1,785	754	0.70 (0.50–0.98)
비타민 B군				
엽산	2	2,508	1,233	0.65 (0.36–1.17)
비타민 B1	3	403,230	1,548	0.97 (0.87–1.08)
무기질 및 미량 원소				
셀레늄	7	161,335	3,086	0.76 (0.56–1.03)
과일 및 채소				
콩류	2	2,541	1,268	0.64 (0.43–0.95)
아보카도	2	112,328	1,165	0.78 (0.60–1.01)
발효 식품 및 프로바이오틱스				
요구르트	2	101,981	906	0.65 (0.25–1.65)
발효식품	3	203,114	2,164	0.66 (0.55–0.80)
지방산 및 지질				
오메가-3 지방산	2	1,061	572	0.31 (0.20–0.48)
다중불포화지방(PUFA)	2	1,061	572	0.41 (0.25–0.68)
오메가-6 지방산	2	1,061	572	0.46 (0.31–0.69)
단일불포화지방(MUFA)	2	547,683	2,981	0.88 (0.36–2.16)
기타				
통곡물 섭취	2	1,486	678	0.55 (0.23–1.33)
유제품	8	306,953	3,788	0.74 (0.54–1.01)
총 식이섬유 섭취	2	676,447	3,990	0.85 (0.77–0.95)
알코올	6	490,657	5,696	0.91 (0.77–1.08)



RR < 1 = 방광암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음

Include subexposures: Yes