
与膀胱癌风险呈负相关的暴露因素
膳食摄入研究的荟萃分析

暴露因素	估计值数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 C	2	4,359	831	0.68 (0.44-1.07)
维生素 E	2	1,785	754	0.70 (0.50-0.98)
B 族维生素				
维生素 B1	3	403,230	1,548	0.97 (0.87-1.08)
水果与蔬菜				
豆类	2	2,541	1,268	0.64 (0.43-0.95)
牛油果	2	112,328	1,165	0.78 (0.60-1.01)
发酵食品与益生菌				
酸奶	2	101,981	906	0.65 (0.25-1.65)
发酵食品	3	203,114	2,164	0.66 (0.55-0.80)
其他				
全谷物摄入量	2	1,486	678	0.55 (0.23-1.33)
乳制品	8	306,953	3,788	0.74 (0.54-1.01)
总膳食纤维摄入量	2	676,447	3,990	0.85 (0.77-0.95)
酒精	6	490,657	5,696	0.91 (0.77-1.08)



RR < 1 = 与膀胱癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠

Include subexposures: Yes