
与肾细胞癌风险呈负相关的暴露因素
膳食摄入研究的荟萃分析

暴露因素	估计值数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
玉米黄质	2	781,129	2,616	0.79 (0.67-0.93)
叶黄素	4	879,626	3,623	0.80 (0.70-0.91)
β-胡萝卜素	5	881,922	4,765	0.98 (0.70-1.36)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 E	4	127,855	2,404	0.67 (0.46-0.99)
维生素 C	5	128,222	2,559	0.76 (0.62-0.94)
B 族维生素				
维生素 B1	2	4,597	1,909	0.72 (0.55-0.92)
多酚与黄酮类				
茶	3	777,802	2,495	0.65 (0.43-0.98)
脂肪酸与脂质				
多不饱和脂肪（PUFA）	2	86,364	1,029	0.88 (0.29-2.65)
其他				
酒精	15	2,782,705	21,572	0.71 (0.63-0.80)
总膳食纤维摄入量	2	4,410	1,621	0.85 (0.65-1.12)



RR < 1 = 与肾细胞癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: Yes