
신장 및 신우암 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인
식이 섭취 연구의 메타분석

노출 요인	추정치 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 A	2	4,597	1,909	1.23 (0.53–2.84)
비타민 B군				
비타민 B1	2	4,597	1,909	1.07 (0.51–2.23)
무기질 및 미량 원소				
칼슘	3	494,621	1,367	1.06 (0.90–1.24)
구리	2	95,958	353	2.44 (0.43–13.84)
지방산 및 지질				
단일불포화지방(MUFA)	2	777,095	1,801	1.39 (0.82–2.35)
대사산물 및 아미노산				
식이 단백질 섭취	2	776,349	2,168	1.30 (0.76–2.24)
기타				
가당음료 섭취	4	599,592	1,649	1.13 (0.98–1.30)
가공육 섭취	6	1,766,660	5,212	1.15 (0.94–1.41)
초가공식품 섭취	3	1,127,884	4,245	1.18 (1.08–1.30)
비영양 감미료 섭취	2	115,981	473	1.28 (1.00–1.63)
붉은 고기	6	1,768,446	5,800	1.43 (1.13–1.82)
유제품	6	512,230	2,409	1.57 (1.10–2.25)



RR > 1 = 신장 및 신우암 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 신뢰구간 아래 점선 = 95% 예측구간 (추정 가능한 경우) | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음

Latest publication per cohort

Include subexposures: Yes