
# 신세포암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인
## 식이 섭취 연구의 메타분석

| 노출 요인 | 추정치 수 | 표본 크기 | 증례 수 | 통합 RR (95% CI) |
|---|---|---|---|---|
| 카로티노이드 | | | | |
| 루테인 | 5 | 881,922 | 4,765 | 0.77 (0.68–0.87) |
| 제아잔틴 | 2 | 781,129 | 2,616 | 0.79 (0.67–0.93) |
| 베타-카로틴 | 5 | 881,922 | 4,765 | 0.98 (0.70–1.36) |
| 비타민 A, C, D, E, K | | | | |
| 비타민 E | 4 | 127,855 | 2,404 | 0.67 (0.45–0.99) |
| 비타민 C | 5 | 128,222 | 2,559 | 0.76 (0.61–0.94) |
| 비타민 D | 2 | 4,112 | 796 | 0.79 (0.65–0.95) |
| 비타민 B군 | | | | |
| 비타민 B1 | 2 | 4,597 | 1,909 | 0.71 (0.55–0.92) |
| 폴리페놀 및 플라보노이드 | | | | |
| 차 | 4 | 804,643 | 2,861 | 0.71 (0.51–1.00) |
| 지방산 및 지질 | | | | |
| 다중불포화지방(PUFA) | 3 | 861,316 | 2,507 | 0.94 (0.52–1.71) |
| 기타 | | | | |
| 알코올 | 19 | 3,619,281 | 24,196 | 0.71 (0.65–0.79) |
| 총 식이섬유 섭취 | 2 | 4,410 | 1,621 | 0.85 (0.64–1.12) |




RR < 1 = 신세포암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 신뢰구간 아래 점선 = 95% 예측구간 (추정 가능한 경우) | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Latest publication per cohort

Include subexposures: Yes