
# Blootstellingen negatief geassocieerd met het risico op nier- en nierbekkenkanker
## Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

| Blootstelling | Schattingen | N | Gevallen | Gepoolde RR (95%-BI) |
|---|---|---|---|---|
| ***CAROTENOÏDEN*** | | | | |
| **Bètacaroteen** | 5 | 881,922 | 4,765 | *0.76 (0.64-0.90)* |
| **Luteïne** | 5 | 881,922 | 4,765 | *0.77 (0.68-0.87)* |
| **Zeaxanthine** | 2 | 781,129 | 2,616 | *0.79 (0.67-0.93)* |
| **Lycopeen** | 3 | 873,444 | 2,860 | *0.84 (0.59-1.22)* |
| ***VITAMINEN A, C, D, E EN K*** | | | | |
| **Vitamine E** | 4 | 127,855 | 2,404 | *0.67 (0.45-0.99)* |
| **Vitamine C** | 5 | 128,222 | 2,559 | *0.76 (0.61-0.94)* |
| **Vitamine D** | 2 | 4,112 | 776 | *0.79 (0.66-0.95)* |
| ***B-VITAMINEN*** | | | | |
| **Foliumzuur** | 2 | 4,597 | 1,909 | *0.74 (0.52-1.05)* |
| ***POLYFENOLEN EN FLAVONOÏDEN*** | | | | |
| **Groene thee** | 2 | 103,012 | 536 | *0.51 (0.24-1.11)* |
| **Thee** | 5 | 907,106 | 3,147 | *0.73 (0.56-0.95)* |
| ***VETZUREN EN LIPIDEN*** | | | | |
| **Meervoudig onverzadigd vet (PUFA)** | 3 | 861,316 | 2,507 | *0.94 (0.52-1.71)* |
| ***OVERIG*** | | | | |
| **Alcohol** | 28 | 14,214,219 | 30,116 | *0.75 (0.68-0.82)* |
| **Totale inname van voedingsvezels** | 3 | 198,798 | 2,632 | *0.87 (0.78-0.97)* |




*RR < 1 = negatief geassocieerd met het risico op nier- en nierbekkenkanker. |◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) |◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) |◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn onder BI = 95%-voorspellingsinterval (indien beschikbaar) | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen | pijlpunt = interval loopt door buiten de as*

Include subexposures: Yes