
与膀胱癌风险呈负相关的营养因子
膳食摄入研究的荟萃分析

营养因子	估计值数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
β-胡萝卜素	5	366,541	1,449	0.88 (0.71-1.10)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 C	3	8,606	902	0.75 (0.56-1.01)
维生素 A	2	121,519	737	0.77 (0.39-1.51)
维生素 E	4	157,524	1,453	0.86 (0.69-1.07)
B 族维生素				
叶酸	4	307,597	1,465	0.73 (0.51-1.05)
矿物质与微量元素				
磷	2	1,147	522	0.97 (0.27-3.50)
多酚与黄酮类				
茶	9	580,076	9,039	0.96 (0.79-1.17)
水果与蔬菜				
豆类	2	2,541	1,268	0.64 (0.43-0.95)
牛油果	2	112,328	1,165	0.78 (0.60-1.01)
发酵食品与益生菌				
酸奶	2	101,981	906	0.64 (0.25-1.66)
发酵食品	5	203,999	2,474	0.75 (0.50-1.12)
脂肪酸与脂质				
单不饱和脂肪（MUFA）	2	648,914	3,592	0.95 (0.44-2.05)
代谢物与氨基酸				
植物蛋白质摄入量	2	585,408	2,402	0.84 (0.70-1.00)
其他				
全谷物摄入量	3	219,042	1,666	0.72 (0.52-1.01)
乳制品	10	799,763	5,469	0.83 (0.65-1.05)
总膳食纤维摄入量	2	676,447	3,990	0.85 (0.76-0.95)
酒精	10	881,889	8,536	0.86 (0.74-1.00)



营养因子类别

类胡萝卜素 · 维生素 A、C、D、E、K · B 族维生素 · 矿物质与微量元素 · 多酚与黄酮类 · 水果与蔬菜 · 发酵食品与益生菌 · 脂肪酸与脂质 · 代谢物与氨基酸 · 其他

RR < 1 = 与膀胱癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 置信区间下方虚线 = 95% 预测区间（可估计时） | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: Yes