
與膀胱癌風險呈正相關的營養因子
膳食攝取研究的統合分析

營養因子	估計值數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
茄紅素	2	222,535	1,249	1.05 (0.87–1.28)
B 群維生素				
維生素 B1	3	575,001	3,737	1.03 (0.88–1.20)
礦物質與微量元素				
鈣	3	493,396	1,881	1.17 (0.83–1.64)
代謝物與胺基酸				
膳食蛋白質攝取量	2	585,408	2,402	1.12 (1.01–1.23)
動物性蛋白質攝取量	2	585,408	2,402	1.15 (1.04–1.28)
其他				
超加工食品攝取量	2	647,537	1,906	1.07 (0.91–1.26)
加工肉類攝取量	8	939,835	6,986	1.10 (0.99–1.22)
紅肉	9	1,417,360	6,876	1.32 (1.11–1.57)
雞蛋	2	1,995	355	3.86 (2.65–5.62)



RR > 1 = 與膀胱癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 信賴區間下方虛線 = 95% 預測區間（可估計時） | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: Yes