
与侵袭性前列腺癌风险呈正相关的营养因子
膳食摄入研究的荟萃分析

营养因子	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
矿物质与微量元素				
钙	5	98,670	-	1.62 (0.92-2.84)
脂肪酸与脂质				
α-亚麻酸	3	383,989	3,504	1.85 (1.03-3.31)
单不饱和脂肪（MUFA）	2	2,234	-	2.39 (1.37-4.15)
饮食模式				
地中海饮食	2	106,146	-	1.02 (0.92-1.13)
其他				
复合维生素	2	343,481	2,040	1.27 (1.04-1.56)
酒精	4	166,503	-	1.28 (0.73-2.26)
乳制品	2	80,266	439	1.39 (1.08-1.78)
加工肉类摄入量	3	177,383	2,103	1.41 (1.20-1.65)
红肉	4	101,424	1,376	1.57 (1.20-2.05)



RR > 1 = 与侵袭性前列腺癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 置信区间下方虚线 = 95% 预测区间（可估计时） | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No

无已发表的亚型基线风险：采用 HR ≈ RR ≈ OR 近似。不估算缺失的病例总数。