
與前列腺癌風險呈正相關的營養因子

營養因子	研究數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
葉黃素	5	3,128	1,292	1.00 (0.63–1.61)
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 D	28	551,351	–	1.13 (1.07–1.19)
維生素 A	13	70,012	17,837	1.15 (0.93–1.42)
B 群維生素				
葉酸	10	157,607	–	1.02 (0.95–1.10)
維生素 B12	5	5,961	2,681	1.12 (0.97–1.28)
抗氧化劑				
抗氧化劑	3	56,601	7,271	1.15 (0.87–1.50)
輔酶 Q10	3	36,416	2,065	1.19 (0.79–1.79)
礦物質與微量元素				
銅	2	43,360	6,174	1.05 (1.00–1.11)
鐵	5	184,031	11,578	1.05 (0.94–1.16)
鎂	3	44,056	6,498	1.05 (0.88–1.25)
鈣	28	1,049,042	–	1.18 (1.10–1.28)
鋅	12	96,718	7,983	1.18 (0.90–1.54)
礦物質補充品	2	57,251	1,958	1.33 (0.79–2.26)
發酵食品與益生菌				
優格	3	201,324	7,680	1.25 (1.00–1.56)
發酵食品	3	3,460	339	1.37 (0.76–2.45)
脂肪酸與脂質				
二十二碳五烯酸（ω–3）	2	143,344	7,412	1.00 (0.97–1.03)
Omega–3 脂肪酸	10	435,151	22,287	1.03 (0.95–1.11)
α–亞麻酸	8	557,816	13,151	1.31 (1.08–1.58)
多元不飽和脂肪（PUFA）	5	64,788	–	1.37 (0.87–2.17)
單元不飽和脂肪（MUFA）	7	56,815	–	1.57 (1.23–1.99)
代謝物與胺基酸				
葡萄糖胺	3	265,129	16,136	1.06 (1.01–1.11)
甜菜鹼	2	48,588	868	1.30 (0.73–2.32)
膽鹼	3	8,815	1,545	1.38 (0.92–2.07)
飲食模式				
地中海飲食	2	106,146	7,476	1.00 (0.90–1.11)
西方飲食模式	2	44,462	1,702	1.35 (1.00–1.82)
其他				
綜合維生素	6	397,821	7,673	1.02 (0.96–1.09)
超加工食品攝取量	3	4,983	2,932	1.10 (0.85–1.42)
全穀物攝取量	3	79,458	7,209	1.11 (0.97–1.26)
加工肉類攝取量	10	1,091,655	65,703	1.13 (1.05–1.21)
酒精	29	1,934,957	–	1.20 (1.10–1.30)
乳製品	24	739,672	33,998	1.22 (1.12–1.34)
紅肉	14	974,550	57,630	1.60 (1.22–2.10)



營養因子類別

類胡蘿蔔素 · 維生素 A、C、D、E、K · B 群維生素 · 抗氧化劑 · 礦物質與微量元素 · 發酵食品與益生菌 · 脂肪酸與脂質 · 代謝物與胺基酸 · 飲食模式 · 其他

RR > 1 = 與前列腺癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 信賴區間下方虛線 = 95% 預測區間（可估計時） | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No