
# 與侵襲性前列腺癌風險呈負相關的營養因子
## 膳食攝取研究的統合分析

| 營養因子 | 研究數 | 樣本數 | 病例數 | 合併 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| **維生素 A、C、D、E、K** | | | | |
| 維生素 E | 2 | 83,022 | 355 | 0.76 (0.29–1.94) |
| **礦物質與微量元素** | | | | |
| 鋅 | 2 | 82,482 | – | 0.84 (0.17–4.29) |
| **水果與蔬菜** | | | | |
| 番茄 | 3 | 124,620 | – | 0.70 (0.54–0.90) |
| **其他** | | | | |
| 總膳食纖維攝取量 | 2 | 885,584 | 5,076 | 0.86 (0.63–1.17) |




RR < 1 = 與侵襲性前列腺癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 信賴區間下方虛線 = 95% 預測區間（可估計時）

無已發表的亞型基線風險：採用 HR ≈ RR ≈ OR 近似。不估算缺失的病例總數。

Include subexposures: No