
# 與膀胱癌風險呈負相關的營養因子

| 營養因子 | 估計值數 | 樣本數 | 病例數 | 合併 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| 類胡蘿蔔素 | | | | |
| 葉黃素 | 3 | 122,821 | 1,415 | 0.69 (0.38–1.27) |
| β-胡蘿蔔素 | 6 | 368,253 | 2,305 | 0.83 (0.66–1.04) |
| 茄紅素 | 3 | 222,792 | 1,333 | 0.95 (0.90–1.00) |
| 維生素 A、C、D、E、K | | | | |
| 維生素 A | 4 | 126,541 | 1,142 | 0.72 (0.52–0.98) |
| 維生素 C | 3 | 8,606 | 902 | 0.75 (0.56–1.01) |
| 維生素 D | 10 | 339,695 | 4,466 | 0.75 (0.35–1.63) |
| 維生素 E | 5 | 158,299 | 1,839 | 0.76 (0.58–1.00) |
| B 群維生素 | | | | |
| 葉酸 | 5 | 309,245 | 2,289 | 0.77 (0.61–0.99) |
| 礦物質與微量元素 | | | | |
| 硒 | 8 | 161,440 | 3,121 | 0.73 (0.54–0.97) |
| 磷 | 2 | 1,147 | 522 | 0.97 (0.27–3.50) |
| 多酚與類黃酮 | | | | |
| 茶 | 9 | 580,076 | 9,039 | 0.96 (0.79–1.17) |
| 水果與蔬菜 | | | | |
| 豆類 | 2 | 2,541 | 1,268 | 0.64 (0.43–0.95) |
| 酪梨 | 2 | 112,328 | 1,165 | 0.78 (0.60–1.01) |
| 發酵食品與益生菌 | | | | |
| 優格 | 2 | 101,981 | 906 | 0.64 (0.25–1.66) |
| 發酵食品 | 5 | 203,999 | 2,474 | 0.75 (0.50–1.12) |
| 脂肪酸與脂質 | | | | |
| Omega-3 脂肪酸 | 2 | 1,061 | 572 | 0.31 (0.20–0.48) |
| 單元不飽和脂肪（MUFA） | 2 | 648,914 | 3,592 | 0.95 (0.44–2.05) |
| 代謝物與胺基酸 | | | | |
| 植物性蛋白質攝取量 | 2 | 585,408 | 2,402 | 0.84 (0.70–1.00) |
| 其他 | | | | |
| 全穀物攝取量 | 3 | 219,042 | 1,666 | 0.72 (0.52–1.01) |
| 乳製品 | 8 | 306,953 | 3,788 | 0.73 (0.53–1.01) |
| 總膳食纖維攝取量 | 2 | 676,447 | 3,990 | 0.85 (0.76–0.95) |
| 酒精 | 11 | 882,294 | 8,649 | 0.86 (0.74–1.00) |




營養因子類別

類胡蘿蔔素 · 維生素 A、C、D、E、K · B 群維生素 · 礦物質與微量元素 · 多酚與類黃酮 · 水果與蔬菜 · 發酵食品與益生菌 · 脂肪酸與脂質 · 代謝物與胺基酸 · 其他

RR < 1 = 與膀胱癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 信賴區間下方虛線 = 95% 預測區間（可估計時） | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No