
Blootstellingen positief geassocieerd met het risico op nier- en nierbekkenkanker
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Schattingen	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
VITAMINEN A, C, D, E EN K				
Vitamine A	2	4,597	1,909	*1.23 (0.53-2.84)*
B-VITAMINEN				
Vitamine B1	2	4,597	1,909	*1.07 (0.51-2.23)*
MINERALEN EN SPORENELEMENTEN				
Koper	2	95,958	353	*2.44 (0.43-13.84)*
VETZUREN EN LIPIDEN				
Enkelvoudig onverzadigd vet (MUFA)	2	777,095	1,801	*1.39 (0.82-2.35)*
METABOLIETEN EN AMINOZUREN				
Eiwitinname via de voeding	2	776,349	2,168	*1.30 (0.76-2.24)*
OVERIG				
Inname van met suiker gezoete dranken	3	563,999	1,503	*1.11 (0.96-1.28)*
Inname van bewerkt vlees	6	1,766,660	5,212	*1.15 (0.94-1.41)*
Rood vlees	6	1,768,446	5,800	*1.43 (1.13-1.82)*
Zuivel	4	19,420	1,051	*2.22 (1.24-3.97)*



RR > 1 = positief geassocieerd met het risico op nier- en nierbekkenkanker. |◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) |◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) |◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn onder BI = 95%-voorspellingsinterval (indien beschikbaar) | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen | pijlpunt = interval loopt door buiten de as

Include subexposures: Yes