
Blootstellingen negatief geassocieerd met het risico op blaaskanker
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Schattingen	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
CAROTENOÏDEN				
Bètacaroteen	5	366,541	1,449	*0.88 (0.71-1.10)*
VITAMINEN A, C, D, E EN K				
Vitamine C	3	8,606	902	*0.75 (0.56-1.01)*
Vitamine A	2	121,519	737	*0.77 (0.39-1.51)*
Vitamine E	4	157,524	1,453	*0.86 (0.69-1.07)*
B-VITAMINEN				
Foliumzuur	4	307,597	1,465	*0.73 (0.51-1.05)*
MINERALEN EN SPORENELEMENTEN				
Fosfor	2	1,147	522	*0.97 (0.27-3.50)*
POLYFENOLEN EN FLAVONOÏDEN				
Thee	9	580,076	9,039	*0.96 (0.79-1.17)*
FRUIT EN GROENTEN				
Peulvruchten	2	2,541	1,268	*0.64 (0.43-0.95)*
Avocado	2	112,328	1,165	*0.78 (0.60-1.01)*
GEFERMENTEERDE VOEDING EN PROBIOTICA				
Yoghurt	2	101,981	906	*0.64 (0.25-1.66)*
Gefermenteerde voedingsmiddelen	5	203,999	2,474	*0.75 (0.50-1.12)*
VETZUREN EN LIPIDEN				
Enkelvoudig onverzadigd vet (MUFA)	2	648,914	3,592	*0.95 (0.44-2.05)*
METABOLIETEN EN AMINOZUREN				
Inname van plantaardige eiwitten	2	585,408	2,402	*0.84 (0.70-1.00)*
OVERIG				
Inname van volkorenproducten	3	219,042	1,666	*0.72 (0.52-1.01)*
Zuivel	8	306,953	3,788	*0.73 (0.53-1.01)*
Totale inname van voedingsvezels	2	676,447	3,990	*0.85 (0.76-0.95)*
Alcohol	10	881,889	8,536	*0.86 (0.74-1.00)*



RR < 1 = negatief geassocieerd met het risico op blaaskanker. |◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) |◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) |◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn onder BI = 95%-voorspellingsinterval (indien beschikbaar) | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen | pijlpunt = interval loopt door buiten de as

Include subexposures: Yes