
# 与肾细胞癌风险呈正相关的营养因子

| 营养因子 | 估计值数 | 样本量 | 病例数 | 合并 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| 类胡萝卜素 | | | | |
| 番茄红素 | 3 | 873,444 | 2,860 | 1.02 (0.73-1.42) |
| 维生素 A、C、D、E、K | | | | |
| 维生素 A | 2 | 4,597 | 1,909 | 1.23 (0.53-2.87) |
| 脂肪酸与脂质 | | | | |
| 单不饱和脂肪（MUFA） | 2 | 777,095 | 1,801 | 1.39 (0.82-2.36) |
| 代谢物与氨基酸 | | | | |
| 膳食蛋白质摄入量 | 2 | 776,349 | 2,168 | 1.30 (0.75-2.25) |
| 其他 | | | | |
| 加工肉类摄入量 | 6 | 1,766,660 | 5,212 | 1.15 (0.94-1.41) |
| 红肉 | 6 | 1,768,446 | 5,800 | 1.43 (1.13-1.81) |
| 乳制品 | 3 | 3,506 | 1,009 | 2.72 (1.22-6.05) |




RR > 1 = 与肾细胞癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 置信区间下方虚线 = 95% 预测区间（可估计时） | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: Yes