
전립선암 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인

노출 요인	연구 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
루테인	5	3,128	1,292	1.00 (0.63-1.61)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 D	28	551,351	-	1.13 (1.07-1.19)
비타민 A	13	70,012	17,837	1.15 (0.93-1.42)
비타민 B군				
엽산	10	157,607	-	1.02 (0.95-1.10)
비타민 B12	5	5,961	2,681	1.12 (0.97-1.28)
항산화제				
항산화제	3	56,601	7,271	1.15 (0.87-1.50)
코엔자임 Q10	3	36,416	2,065	1.19 (0.79-1.79)
무기질 및 미량 원소				
구리	2	43,360	6,174	1.05 (1.00-1.11)
철	5	184,031	11,578	1.05 (0.94-1.16)
마그네슘	3	44,056	6,498	1.05 (0.88-1.25)
칼슘	28	1,049,042	-	1.18 (1.10-1.28)
아연	12	96,718	7,983	1.18 (0.90-1.54)
미네랄 보충제	2	57,251	1,958	1.33 (0.79-2.26)
발효 식품 및 프로바이오틱스				
요구르트	3	201,324	7,680	1.25 (1.00-1.56)
발효식품	3	3,460	339	1.37 (0.76-2.45)
지방산 및 지질				
도코사펜타엔산(오메가-3)	2	143,344	7,412	1.00 (0.97-1.03)
오메가-3 지방산	10	435,151	22,287	1.03 (0.95-1.11)
알파-리놀렌산	8	557,816	13,151	1.31 (1.08-1.58)
다중불포화지방(PUFA)	5	64,788	-	1.37 (0.87-2.17)
단일불포화지방(MUFA)	7	56,815	-	1.57 (1.23-1.99)
대사산물 및 아미노산				
글루코사민	3	265,129	16,136	1.06 (1.01-1.11)
베타인	2	48,588	868	1.30 (0.73-2.32)
콜린	3	8,815	1,545	1.38 (0.92-2.07)
식사 패턴				
지중해식 식단	2	106,146	7,476	1.00 (0.90-1.11)
서구식 식이 패턴	2	44,462	1,702	1.35 (1.00-1.82)
기타				
종합비타민	6	397,821	7,673	1.02 (0.96-1.09)
초가공식품 섭취	6	248,736	13,760	1.02 (0.95-1.10)
통곡물 섭취	3	79,458	7,209	1.11 (0.97-1.26)
가공육 섭취	10	1,091,655	65,703	1.13 (1.05-1.21)
알코올	29	1,934,957	-	1.20 (1.10-1.30)
유제품	24	739,672	33,998	1.22 (1.12-1.34)
붉은 고기	14	974,550	57,630	1.60 (1.22-2.10)



노출 요인군

카로티노이드 · 비타민 A, C, D, E, K · 비타민 B군 · 항산화제 · 무기질 및 미량 원소 · 발효 식품 및 프로바이오틱스 · 지방산 및 지질 · 대사산물 및 아미노산 · 식사 패턴 · 기타

RR > 1 = 전립선암 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 신뢰구간 아래 점선 = 95% 예측구간 (추정 가능한 경우) | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: No