
신세포암 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인

노출 요인	추정치 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
라이코펜	3	873,444	2,860	1.02 (0.73–1.42)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 A	2	4,597	1,909	1.23 (0.53–2.87)
대사산물 및 아미노산				
식이 단백질 섭취	2	776,349	2,168	1.30 (0.75–2.25)
기타				
가공육 섭취	6	1,766,660	5,212	1.15 (0.94–1.41)
초가공식품 섭취	2	647,537	594	1.38 (1.02–1.85)
붉은 고기	6	1,768,446	5,800	1.43 (1.13–1.81)
유제품	3	3,506	1,009	2.72 (1.22–6.05)



RR > 1 = 신세포암 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 신뢰구간 아래 점선 = 95% 예측구간 (추정 가능한 경우) | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: No