
# 방광암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인
# 식이 섭취 연구의 메타분석

| 노출 요인 | 추정치 수 | 표본 크기 | 증례 수 | 통합 RR (95% CI) |
|---|---|---|---|---|
| 카로티노이드 | | | | |
| 베타-카로틴 | 5 | 366,541 | 1,449 | 0.88 (0.71–1.10) |
| 비타민 A, C, D, E, K | | | | |
| 비타민 C | 3 | 8,606 | 902 | 0.75 (0.56–1.01) |
| 비타민 A | 2 | 121,519 | 737 | 0.77 (0.39–1.51) |
| 비타민 E | 4 | 157,524 | 1,453 | 0.86 (0.69–1.07) |
| 비타민 B군 | | | | |
| 엽산 | 4 | 307,597 | 1,465 | 0.73 (0.51–1.05) |
| 무기질 및 미량 원소 | | | | |
| 인 | 2 | 1,147 | 522 | 0.97 (0.27–3.50) |
| 폴리페놀 및 플라보노이드 | | | | |
| 차 | 9 | 580,076 | 9,039 | 0.96 (0.79–1.17) |
| 과일 및 채소 | | | | |
| 콩류 | 2 | 2,541 | 1,268 | 0.64 (0.43–0.95) |
| 아보카도 | 2 | 112,328 | 1,165 | 0.78 (0.60–1.01) |
| 발효 식품 및 프로바이오틱스 | | | | |
| 요구르트 | 2 | 101,981 | 906 | 0.64 (0.25–1.66) |
| 발효식품 | 5 | 203,999 | 2,474 | 0.75 (0.50–1.12) |
| 지방산 및 지질 | | | | |
| 단일불포화지방(MUFA) | 2 | 648,914 | 3,592 | 0.95 (0.44–2.05) |
| 대사산물 및 아미노산 | | | | |
| 식물성 단백질 섭취 | 2 | 585,408 | 2,402 | 0.84 (0.70–1.00) |
| 기타 | | | | |
| 통곡물 섭취 | 3 | 219,042 | 1,666 | 0.72 (0.52–1.01) |
| 유제품 | 10 | 799,763 | 5,469 | 0.83 (0.65–1.05) |
| 총 식이섬유 섭취 | 2 | 676,447 | 3,990 | 0.85 (0.76–0.95) |
| 알코올 | 10 | 881,889 | 8,536 | 0.86 (0.74–1.00) |




RR < 1 = 방광암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 신뢰구간 아래 점선 = 95% 예측구간 (추정 가능한 경우) | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: No