
Blootstellingen positief geassocieerd met het risico op niercelcarcinoom
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Schattingen	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
CAROTENOÏDEN				
Lycopeen	3	873,444	2,860	*1.02 (0.73-1.42)*
VITAMINEN A, C, D, E EN K				
Vitamine A	2	4,597	1,909	*1.23 (0.53-2.87)*
B-VITAMINEN				
Foliumzuur	2	4,597	1,909	*1.18 (0.60-2.32)*
METABOLIETEN EN AMINOZUREN				
Eiwitinname via de voeding	2	776,349	2,168	*1.30 (0.75-2.25)*
OVERIG				
Inname van bewerkt vlees	6	1,766,660	5,212	*1.15 (0.94-1.41)*
Inname van ultrabewerkte voedingsmiddelen	2	647,537	594	*1.38 (1.02-1.85)*
Rood vlees	6	1,768,446	5,800	*1.43 (1.13-1.81)*
Zuivel	3	3,506	1,009	*2.72 (1.22-6.05)*



RR > 1 = positief geassocieerd met het risico op niercelcarcinoom. |◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) |◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) |◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn onder BI = 95%-voorspellingsinterval (indien beschikbaar) | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen | pijlpunt = interval loopt door buiten de as

Include subexposures: No