
# 与膀胱癌风险呈正相关的营养因子
# 膳食摄入研究的荟萃分析

| 营养因子 | 估计值数 | 样本量 | 病例数 | 合并 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| 类胡萝卜素 | | | | |
| 番茄红素 | 2 | 222,535 | 1,249 | 1.05 (0.87-1.28) |
| B 族维生素 | | | | |
| 维生素 B1 | 3 | 575,001 | 3,737 | 1.03 (0.88-1.20) |
| 矿物质与微量元素 | | | | |
| 钙 | 3 | 493,396 | 1,881 | 1.17 (0.83-1.64) |
| 代谢物与氨基酸 | | | | |
| 膳食蛋白质摄入量 | 2 | 585,408 | 2,402 | 1.12 (1.01-1.23) |
| 动物蛋白质摄入量 | 2 | 585,408 | 2,402 | 1.15 (1.04-1.28) |
| 其他 | | | | |
| 超加工食品摄入量 | 2 | 647,537 | 1,906 | 1.07 (0.91-1.26) |
| 加工肉类摄入量 | 8 | 939,835 | 6,986 | 1.10 (0.99-1.22) |
| 红肉 | 9 | 1,417,360 | 6,876 | 1.32 (1.11-1.57) |
| 鸡蛋 | 2 | 1,995 | 355 | 3.86 (2.65-5.62) |




RR > 1 = 与膀胱癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 置信区间下方虚线 = 95% 预测区间（可估计时） | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No