
방광암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인

노출 요인	추정치 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
루테인	3	122,821	1,415	0.69 (0.38-1.27)
베타-카로틴	6	368,253	2,305	0.83 (0.66-1.04)
라이코펜	3	222,792	1,333	0.95 (0.90-1.00)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 A	4	126,541	1,142	0.72 (0.52-0.98)
비타민 C	3	8,606	902	0.75 (0.56-1.01)
비타민 D	10	339,695	4,466	0.75 (0.35-1.63)
비타민 E	5	158,299	1,839	0.76 (0.58-1.00)
비타민 B군				
엽산	5	309,245	2,289	0.77 (0.61-0.99)
무기질 및 미량 원소				
셀레늄	8	161,440	3,121	0.73 (0.54-0.97)
인	2	1,147	522	0.97 (0.27-3.50)
폴리페놀 및 플라보노이드				
차	9	580,076	9,039	0.96 (0.79-1.17)
과일 및 채소				
콩류	2	2,541	1,268	0.64 (0.43-0.95)
아보카도	2	112,328	1,165	0.78 (0.60-1.01)
발효 식품 및 프로바이오틱스				
요구르트	2	101,981	906	0.64 (0.25-1.66)
발효식품	5	203,999	2,474	0.75 (0.50-1.12)
지방산 및 지질				
오메가-3 지방산	2	1,061	572	0.31 (0.20-0.48)
다중불포화지방(PUFA)	2	1,061	572	0.40 (0.24-0.67)
오메가-6 지방산	2	1,061	572	0.46 (0.31-0.69)
단일불포화지방(MUFA)	3	649,414	3,842	0.79 (0.41-1.52)
대사산물 및 아미노산				
식물성 단백질 섭취	2	585,408	2,402	0.84 (0.70-1.00)
기타				
통곡물 섭취	3	219,042	1,666	0.72 (0.52-1.01)
유제품	10	799,763	5,469	0.83 (0.65-1.05)
총 식이섬유 섭취	2	676,447	3,990	0.85 (0.76-0.95)
알코올	11	882,294	8,649	0.86 (0.74-1.00)



RR < 1 = 방광암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 신뢰구간 아래 점선 = 95% 예측구간 (추정 가능한 경우) | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: Yes