
与前列腺癌风险呈正相关的暴露因素
膳食摄入研究的荟萃分析

暴露因素	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 A	5	3,207	1,358	1.12 (0.63-1.99)
维生素 D	3	247,791	29,373	1.34 (0.90-2.01)
B 族维生素				
维生素 B12	2	719	245	1.47 (1.02-2.12)
抗氧化剂				
抗氧化剂	2	50,507	7,155	1.08 (0.76-1.54)
矿物质与微量元素				
铁	4	183,783	11,462	1.02 (0.94-1.10)
硒	10	235,441	18,652	1.02 (0.93-1.12)
锌	9	94,876	7,312	1.18 (0.92-1.51)
钙	19	770,289	-	1.23 (1.12-1.36)
矿物质补充剂	2	57,251	1,958	1.33 (0.79-2.26)
发酵食品与益生菌				
酸奶	3	201,324	7,680	1.25 (1.00-1.56)
发酵食品	3	3,460	339	1.37 (0.76-2.45)
脂肪酸与脂质				
Omega-3 脂肪酸	4	146,440	8,609	1.04 (0.85-1.28)
α-亚麻酸	6	556,471	12,655	1.32 (1.08-1.62)
单不饱和脂肪（MUFA）	5	54,911	-	1.47 (1.12-1.93)
多不饱和脂肪（PUFA）	4	63,836	-	1.74 (1.09-2.77)
饮食模式				
地中海饮食	2	106,146	7,476	1.00 (0.90-1.11)
西方膳食模式	2	44,462	1,702	1.35 (1.00-1.82)
其他				
超加工食品摄入量	3	4,983	2,932	1.10 (0.85-1.42)
全谷物摄入量	3	79,458	7,209	1.11 (0.97-1.26)
加工肉类摄入量	10	1,091,655	65,703	1.13 (1.05-1.21)
复合维生素	4	348,954	4,443	1.14 (0.98-1.33)
酒精	29	1,934,957	-	1.20 (1.10-1.30)
乳制品	24	739,672	33,998	1.22 (1.12-1.34)
红肉	14	974,550	57,630	1.60 (1.22-2.10)



暴露类别

维生素 A、C、D、E、K　抗氧化剂　发酵食品与益生菌　饮食模式　其他
B 族维生素　矿物质与微量元素　脂肪酸与脂质

RR > 1 = 与前列腺癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No