
# 與腎臟及腎盂癌風險呈負相關的暴露因子
# 膳食攝取研究的統合分析

| 暴露因子 | 估計值數 | 樣本數 | 病例數 | 合併 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| **類胡蘿蔔素** | | | | |
| β-胡蘿蔔素 | 5 | 881,922 | 4,765 | 0.76 (0.64–0.90) |
| 葉黃素 | 5 | 881,922 | 4,765 | 0.77 (0.68–0.87) |
| 玉米黃素 | 2 | 781,129 | 2,616 | 0.79 (0.67–0.93) |
| 茄紅素 | 3 | 873,444 | 2,860 | 0.84 (0.59–1.22) |
| **維生素 A、C、D、E、K** | | | | |
| 維生素 E | 4 | 127,855 | 2,404 | 0.67 (0.45–0.99) |
| 維生素 C | 5 | 128,222 | 2,559 | 0.76 (0.61–0.94) |
| 維生素 D | 2 | 4,112 | 776 | 0.79 (0.66–0.95) |
| **B 群維生素** | | | | |
| 葉酸 | 2 | 4,597 | 1,909 | 0.74 (0.52–1.05) |
| **多酚與類黃酮** | | | | |
| 綠茶 | 2 | 103,012 | 536 | 0.51 (0.24–1.11) |
| 茶 | 5 | 907,106 | 3,147 | 0.73 (0.56–0.95) |
| **其他** | | | | |
| 酒精 | 27 | 14,136,959 | 29,867 | 0.75 (0.68–0.83) |
| 總膳食纖維攝取量 | 3 | 198,798 | 2,632 | 0.87 (0.78–0.97) |




RR < 1 = 與腎臟及腎盂癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No