
Blootstellingen positief geassocieerd met het risico op agressieve prostaatkanker
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Onderzoeken	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
MINERALEN EN SPORENELEMENTEN				
Calcium	5	98,670	-	*1.62 (0.92-2.84)*
VETZUREN EN LIPIDEN				
Alfa-linoleenzuur	3	383,989	3,504	*1.85 (1.03-3.31)*
Omega 3-vetzuren	3	383,989	3,504	*1.85 (1.03-3.31)*
Meervoudig onverzadigd vet (PUFA)	4	385,026	-	*1.97 (1.16-3.35)*
Enkelvoudig onverzadigd vet (MUFA)	2	2,234	-	*2.39 (1.37-4.15)*
VOEDINGSPATRONEN				
Mediterraan dieet	2	106,146	-	*1.02 (0.92-1.13)*
OVERIG				
Multivitaminen	2	343,481	2,040	*1.27 (1.04-1.56)*
Alcohol	4	166,503	-	*1.28 (0.73-2.26)*
Zuivel	2	80,266	439	*1.39 (1.08-1.78)*
Inname van bewerkt vlees	3	177,383	2,103	*1.41 (1.20-1.65)*
Rood vlees	4	101,424	1,376	*1.57 (1.20-2.05)*



RR > 1 = positief geassocieerd met het risico op agressieve prostaatkanker. | ◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal onderzoeken) | ◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) | ◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | pijlpunt = interval loopt door buiten de as

Include subexposures: Yes

Geen gepubliceerd basisrisico voor dit subtype: HR ≈ RR ≈ OR. Ontbrekende aantallen gevallen worden niet geschat.