
Blootstellingen positief geassocieerd met het risico op blaaskanker
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Schattingen	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
CAROTENOÏDEN				
Lycopeen	2	222,535	1,249	*1.05 (0.87-1.28)*
B-VITAMINEN				
Vitamine B1	3	575,001	3,737	*1.03 (0.88-1.20)*
FYTO-OESTROGENEN				
Soja	2	32,477	181	*1.51 (0.19-12.07)*
METABOLIETEN EN AMINOZUREN				
Eiwitinname via de voeding	2	585,408	2,402	*1.12 (1.01-1.23)*
Inname van dierlijke eiwitten	2	585,408	2,402	*1.15 (1.04-1.28)*
OVERIG				
Inname van bewerkt vlees	7	938,913	6,956	*1.09 (0.98-1.21)*
Rood vlees	9	1,417,360	6,876	*1.32 (1.11-1.57)*
Eieren	2	1,995	355	*3.86 (2.65-5.62)*



RR > 1 = positief geassocieerd met het risico op blaaskanker. | ◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) | ◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) | ◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen

Include subexposures: Yes