
# 与肾细胞癌风险呈负相关的暴露因素

| 暴露因素 | 估计值数 | 样本量 | 病例数 | 合并 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| 类胡萝卜素 | | | | |
| 叶黄素 | 5 | 881,922 | 4,765 | 0.77 (0.68-0.87) |
| 玉米黄质 | 2 | 781,129 | 2,616 | 0.79 (0.67-0.93) |
| β-胡萝卜素 | 5 | 881,922 | 4,765 | 0.98 (0.70-1.36) |
| 维生素 A、C、D、E、K | | | | |
| 维生素 E | 4 | 127,855 | 2,404 | 0.67 (0.45-0.99) |
| 维生素 C | 5 | 128,222 | 2,559 | 0.76 (0.61-0.94) |
| 维生素 D | 9 | 153,812 | 2,840 | 0.82 (0.67-1.00) |
| B 族维生素 | | | | |
| 维生素 B12 | 2 | 1,959 | 730 | 0.63 (0.47-0.85) |
| 维生素 B1 | 2 | 4,597 | 1,909 | 0.71 (0.55-0.92) |
| 维生素 B6 | 4 | 4,771 | 2,002 | 0.73 (0.52-1.04) |
| 叶酸 | 6 | 84,212 | 3,088 | 0.76 (0.50-1.17) |
| 维生素 B2 | 3 | 3,861 | 1,547 | 0.84 (0.68-1.04) |
| 矿物质与微量元素 | | | | |
| 硒 | 2 | 3,471 | 1,543 | 0.53 (0.04-7.15) |
| 钙 | 2 | 2,273 | 154 | 0.62 (0.16-2.40) |
| 多酚与黄酮类 | | | | |
| 茶 | 4 | 804,643 | 2,861 | 0.71 (0.51-1.00) |
| 脂肪酸与脂质 | | | | |
| 多不饱和脂肪（PUFA） | 3 | 861,316 | 2,507 | 0.94 (0.52-1.71) |
| 其他 | | | | |
| 酒精 | 20 | 3,783,725 | 11,677 | 0.72 (0.65-0.79) |
| 总膳食纤维摄入量 | 2 | 4,410 | 1,621 | 0.85 (0.64-1.12) |




RR < 1 = 与肾细胞癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: Yes