
# 與腎細胞癌風險呈負相關的暴露因子

| 暴露因子 | 估計值數 | 樣本數 | 病例數 | 合併 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| **類胡蘿蔔素** | | | | |
| 葉黃素 | 5 | 881,922 | 4,765 | 0.77 (0.68–0.87) |
| 玉米黃素 | 2 | 781,129 | 2,616 | 0.79 (0.67–0.93) |
| β-胡蘿蔔素 | 5 | 881,922 | 4,765 | 0.98 (0.70–1.36) |
| **維生素 A、C、D、E、K** | | | | |
| 維生素 E | 4 | 127,855 | 2,404 | 0.67 (0.45–0.99) |
| 維生素 C | 5 | 128,222 | 2,559 | 0.76 (0.61–0.94) |
| 維生素 D | 9 | 153,812 | 2,840 | 0.82 (0.67–1.00) |
| **B 群維生素** | | | | |
| 維生素 B12 | 2 | 1,959 | 730 | 0.63 (0.47–0.85) |
| 維生素 B1 | 2 | 4,597 | 1,909 | 0.71 (0.55–0.92) |
| 維生素 B6 | 4 | 4,771 | 2,002 | 0.73 (0.52–1.04) |
| 葉酸 | 6 | 84,212 | 3,088 | 0.76 (0.50–1.17) |
| 維生素 B2 | 3 | 3,861 | 1,547 | 0.84 (0.68–1.04) |
| **礦物質與微量元素** | | | | |
| 硒 | 2 | 3,471 | 1,543 | 0.53 (0.04–7.15) |
| 鈣 | 2 | 2,273 | 154 | 0.62 (0.16–2.40) |
| **多酚與類黃酮** | | | | |
| 茶 | 4 | 804,643 | 2,861 | 0.71 (0.51–1.00) |
| **脂肪酸與脂質** | | | | |
| 多元不飽和脂肪（PUFA） | 3 | 861,316 | 2,507 | 0.94 (0.52–1.71) |
| **其他** | | | | |
| 酒精 | 20 | 3,783,725 | 11,677 | 0.72 (0.65–0.79) |
| 總膳食纖維攝取量 | 2 | 4,410 | 1,621 | 0.85 (0.64–1.12) |




RR < 1 = 與腎細胞癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: Yes