效應量與異質性 – 前列腺癌

異質性，I^2（%）

效應量（合併 RR）

100
80
60
40
20
0
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6

紅肉
抗氧化劑
維生素 A
單元不飽和脂肪（MUFA）
酒精
大蒜
茶
硒
葉黃素
全穀物攝取量
α–亞麻酸
鈣
黃豆
維生素 C
β–胡蘿蔔素
番茄
多元不飽和脂肪（PUFA）
乳製品
膽鹼
鐵
鋅
非水溶性膳食纖維攝取量
Omega–3 脂肪酸
Omega–6 脂肪酸
加工肉類攝取量
亞油酸
超加工食品攝取量
維生素 D
綠茶
褪黑激素
維生素 E
鎂
茄紅素
輔酶 Q10
二十碳五烯酸
維生素 B12
染料木黃酮
發酵食品
Omega–9 脂肪酸
玉米黃素
豆類
二十二碳六烯酸
優格
葉酸
總膳食纖維攝取量
綜合維生素
維生素 B6
雞蛋
葡萄糖胺
水溶性膳食纖維攝取量

點大小反映研究數量；顏色區分各暴露因子；虛線標示 RR = 1。
Include subexposures: Yes