
# 전립선암 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인
# 식이 섭취 연구의 메타분석

| 노출 요인 | 연구 수 | 표본 크기 | 증례 수 | 통합 RR (95% CI) |
|---|---|---|---|---|
| 비타민 A, C, D, E, K | | | | |
| 비타민 A | 5 | 3,207 | 1,358 | 1.12 (0.63-1.99) |
| 비타민 D | 3 | 247,791 | 29,373 | 1.34 (0.90-2.01) |
| 비타민 B군 | | | | |
| 비타민 B12 | 2 | 719 | 245 | 1.47 (1.02-2.12) |
| 항산화제 | | | | |
| 항산화제 | 2 | 50,507 | 7,155 | 1.08 (0.76-1.54) |
| 무기질 및 미량 원소 | | | | |
| 철 | 4 | 183,783 | 11,462 | 1.02 (0.94-1.10) |
| 셀레늄 | 10 | 235,441 | 18,652 | 1.02 (0.93-1.12) |
| 아연 | 9 | 94,876 | 7,312 | 1.18 (0.92-1.51) |
| 칼슘 | 19 | 770,289 | - | 1.23 (1.12-1.36) |
| 미네랄 보충제 | 2 | 57,251 | 1,958 | 1.33 (0.79-2.26) |
| 발효 식품 및 프로바이오틱스 | | | | |
| 요구르트 | 3 | 201,324 | 7,680 | 1.25 (1.00-1.56) |
| 발효식품 | 3 | 3,460 | 339 | 1.37 (0.76-2.45) |
| 지방산 및 지질 | | | | |
| 오메가-3 지방산 | 14 | 1,417,896 | 43,097 | 1.04 (0.85-1.28) |
| 알파-리놀렌산 | 6 | 556,471 | 12,655 | 1.32 (1.08-1.62) |
| 단일불포화지방(MUFA) | 7 | 255,429 | - | 1.47 (1.12-1.93) |
| 다중불포화지방(PUFA) | 19 | 1,484,477 | - | 1.74 (1.09-2.77) |
| 식사 패턴 | | | | |
| 지중해식 식단 | 2 | 106,146 | 7,476 | 1.00 (0.90-1.11) |
| 서구식 식이 패턴 | 2 | 44,462 | 1,702 | 1.35 (1.00-1.82) |
| 기타 | | | | |
| 초가공식품 섭취 | 3 | 4,983 | 2,932 | 1.10 (0.85-1.42) |
| 통곡물 섭취 | 3 | 79,458 | 7,209 | 1.11 (0.97-1.26) |
| 가공육 섭취 | 10 | 1,091,655 | 65,703 | 1.13 (1.05-1.21) |
| 종합비타민 | 4 | 348,954 | 4,443 | 1.14 (0.98-1.33) |
| 알코올 | 29 | 1,934,957 | - | 1.20 (1.10-1.30) |
| 유제품 | 24 | 739,672 | 33,998 | 1.22 (1.12-1.34) |
| 붉은 고기 | 14 | 974,550 | 57,630 | 1.60 (1.22-2.10) |




노출 요인군
비타민 A, C, D, E, K
비타민 B군
항산화제
무기질 및 미량 원소
발효 식품 및 프로바이오틱스
지방산 및 지질
식사 패턴
기타

RR > 1 = 전립선암 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐