
与前列腺癌风险呈负相关的暴露因素

暴露因素	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
玉米黄质	4	2,106	808	0.66 (0.40-1.08)
番茄红素	20	321,509	28,185	0.85 (0.78-0.93)
β-胡萝卜素	15	122,141	-	0.92 (0.76-1.11)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 K	4	34,701	1,054	0.73 (0.58-0.92)
维生素 C	11	68,944	7,699	0.87 (0.75-1.03)
维生素 E	25	404,649	36,660	0.94 (0.87-1.02)
B 族维生素				
维生素 B6	3	70,879	7,656	0.89 (0.83-0.96)
矿物质与微量元素				
硒	28	382,643	29,947	0.77 (0.67-0.89)
多酚与黄酮类				
绿茶	7	99,090	1,577	0.62 (0.43-0.89)
茶	10	314,398	15,389	0.75 (0.64-0.89)
水果与蔬菜				
大蒜	3	36,604	2,168	0.69 (0.42-1.13)
番茄	11	1,057,923	67,108	0.74 (0.64-0.85)
豆类	8	1,155,076	79,072	0.89 (0.81-0.97)
脂肪酸与脂质				
亚油酸	7	8,735	3,057	0.71 (0.50-0.99)
油酸	2	58,714	851	0.80 (0.24-2.64)
鱼油	2	37,289	1,735	0.89 (0.68-1.17)
二十二碳六烯酸	3	144,141	7,729	0.94 (0.74-1.20)
Omega-6 脂肪酸	11	264,882	5,940	0.96 (0.79-1.17)
二十碳五烯酸	5	444,156	13,552	0.99 (0.89-1.11)
植物雌激素				
大豆	8	85,059	5,399	0.60 (0.41-0.89)
染料木黄酮	9	91,302	3,818	0.72 (0.54-0.95)
草本与植物制品				
银杏	2	38,308	1,665	0.93 (0.68-1.27)
代谢物与氨基酸				
膳食蛋白质摄入量	2	109,557	3,064	0.99 (0.89-1.11)
激素与内源性物质				
褪黑素	3	4,618	1,414	0.75 (0.45-1.23)
饮食模式				
植物性饮食	2	211,318	24,516	0.91 (0.84-0.99)
DASH饮食	2	152,714	-	0.93 (0.82-1.06)
其他				
不溶性膳食纤维摄入量	3	101,084	-	0.62 (0.38-1.03)
可溶性膳食纤维摄入量	3	80,888	10,851	0.89 (0.83-0.96)
总膳食纤维摄入量	7	972,077	64,899	0.92 (0.86-1.00)
鸡蛋	3	900,752	53,381	0.99 (0.96-1.02)



暴露类别

类胡萝卜素 · 维生素 A、C、D、E、K · B 族维生素 · 矿物质与微量元素 · 多酚与黄酮类 · 水果与蔬菜 · 脂肪酸与脂质 · 植物雌激素 · 草本与植物制品 · 代谢物与氨基酸 · 激素与内源性物质 · 饮食模式 · 其他

RR < 1 = 与前列腺癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外