
與侵襲性前列腺癌風險呈負相關的暴露因子

暴露因子	研究數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
茄紅素	2	166,781	–	0.58 (0.39–0.87)
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 E	4	114,280	–	0.64 (0.40–1.04)
維生素 D	7	45,247	–	0.74 (0.51–1.08)
礦物質與微量元素				
硒	5	123,475	–	0.65 (0.37–1.12)
鋅	2	82,482	–	0.84 (0.17–4.29)
水果與蔬菜				
番茄	3	124,620	–	0.70 (0.54–0.90)
其他				
總膳食纖維攝取量	2	885,584	5,076	0.86 (0.63–1.17)



RR < 1 = 與侵襲性前列腺癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

無已發表的亞型基線風險：採用 HR ≈ RR ≈ OR 近似。不估算缺失的病例總數。

Include subexposures: No