
# 전립선암 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인

| 노출 요인 | 연구 수 | 표본 크기 | 증례 수 | 통합 RR (95% CI) |
|---|---|---|---|---|
| 카로티노이드 | | | | |
| 루테인 | 5 | 3,128 | 1,292 | 1.00 (0.63-1.61) |
| 비타민 A, C, D, E, K | | | | |
| 비타민 D | 28 | 551,351 | - | 1.13 (1.07-1.19) |
| 비타민 A | 13 | 70,012 | 17,837 | 1.15 (0.93-1.42) |
| 비타민 B군 | | | | |
| 엽산 | 10 | 157,607 | - | 1.02 (0.95-1.10) |
| 비타민 B12 | 5 | 5,961 | 2,681 | 1.12 (0.97-1.28) |
| 항산화제 | | | | |
| 항산화제 | 3 | 56,601 | 7,271 | 1.15 (0.87-1.50) |
| 코엔자임 Q10 | 3 | 36,416 | 2,065 | 1.19 (0.79-1.79) |
| 무기질 및 미량 원소 | | | | |
| 구리 | 2 | 43,360 | 6,174 | 1.05 (1.00-1.11) |
| 철 | 5 | 184,031 | 11,578 | 1.05 (0.94-1.16) |
| 마그네슘 | 3 | 44,056 | 6,498 | 1.05 (0.88-1.25) |
| 칼슘 | 28 | 1,049,042 | - | 1.18 (1.10-1.28) |
| 아연 | 12 | 96,718 | 7,983 | 1.18 (0.90-1.54) |
| 미네랄 보충제 | 2 | 57,251 | 1,958 | 1.33 (0.79-2.26) |
| 발효 식품 및 프로바이오틱스 | | | | |
| 요구르트 | 3 | 201,324 | 7,680 | 1.25 (1.00-1.56) |
| 발효식품 | 3 | 3,460 | 339 | 1.37 (0.76-2.45) |
| 지방산 및 지질 | | | | |
| 도코사펜타엔산(오메가-3) | 2 | 143,344 | 7,412 | 1.00 (0.97-1.03) |
| 오메가-3 지방산 | 16 | 896,938 | 34,805 | 1.03 (0.98-1.09) |
| 다중불포화지방(PUFA) | 25 | 953,107 | - | 1.07 (1.00-1.14) |
| 알파-리놀렌산 | 8 | 557,816 | 13,151 | 1.31 (1.08-1.58) |
| 단일불포화지방(MUFA) | 10 | 257,768 | - | 1.33 (1.14-1.56) |
| 대사산물 및 아미노산 | | | | |
| 글루코사민 | 3 | 265,129 | 16,136 | 1.06 (1.01-1.11) |
| 베타인 | 2 | 48,588 | 868 | 1.30 (0.73-2.32) |
| 콜린 | 3 | 8,815 | 1,545 | 1.38 (0.92-2.07) |
| 식사 패턴 | | | | |
| 지중해식 식단 | 2 | 106,146 | 7,476 | 1.00 (0.90-1.11) |
| 서구식 식이 패턴 | 2 | 44,462 | 1,702 | 1.35 (1.00-1.82) |
| 기타 | | | | |
| 종합비타민 | 6 | 397,821 | 7,673 | 1.02 (0.96-1.09) |
| 초가공식품 섭취 | 3 | 4,983 | 2,932 | 1.10 (0.85-1.42) |
| 통곡물 섭취 | 3 | 79,458 | 7,209 | 1.11 (0.97-1.26) |
| 가공육 섭취 | 10 | 1,091,655 | 65,703 | 1.13 (1.05-1.21) |
| 알코올 | 29 | 1,934,957 | - | 1.20 (1.10-1.30) |
| 유제품 | 24 | 739,672 | 33,998 | 1.22 (1.12-1.34) |
| 붉은 고기 | 14 | 974,550 | 57,630 | 1.60 (1.22-2.10) |




노출 요인군

카로티노이드 · 비타민 A, C, D, E, K · 비타민 B군 · 항산화제 · 무기질 및 미량 원소 · 발효 식품 및 프로바이오틱스 · 지방산 및 지질 · 대사산물 및 아미노산 · 식사 패턴 · 기타

RR > 1 = 전립선암 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: Yes