
與前列腺癌風險呈正相關的營養因子
膳食攝取研究的統合分析

營養因子	研究數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 A	5	3,207	1,358	1.12 (0.63-1.99)
維生素 D	3	247,791	29,373	1.34 (0.90-2.01)
B 群維生素				
維生素 B12	2	719	245	1.47 (1.02-2.12)
抗氧化劑				
抗氧化劑	2	50,507	7,155	1.08 (0.76-1.54)
礦物質與微量元素				
鐵	4	183,783	11,462	1.02 (0.94-1.10)
硒	10	235,441	18,652	1.02 (0.93-1.12)
鋅	9	94,876	7,312	1.18 (0.92-1.51)
鈣	19	770,289	-	1.23 (1.12-1.36)
礦物質補充品	2	57,251	1,958	1.33 (0.79-2.26)
發酵食品與益生菌				
優格	3	201,324	7,680	1.25 (1.00-1.56)
發酵食品	3	3,460	339	1.37 (0.76-2.45)
脂肪酸與脂質				
Omega-3 脂肪酸	8	607,190	20,690	1.06 (0.95-1.18)
Omega-9 脂肪酸	2	200,518	7,678	1.08 (0.84-1.40)
多元不飽和脂肪（PUFA）	13	673,771	-	1.21 (1.07-1.36)
單元不飽和脂肪（MUFA）	7	255,429	-	1.27 (1.08-1.48)
α-亞麻酸	6	556,471	12,655	1.32 (1.08-1.62)
飲食模式				
地中海飲食	2	106,146	7,476	1.00 (0.90-1.11)
西方飲食模式	2	44,462	1,702	1.35 (1.00-1.82)
其他				
超加工食品攝取量	6	248,736	13,760	1.02 (0.95-1.10)
全穀物攝取量	3	79,458	7,209	1.11 (0.97-1.26)
加工肉類攝取量	10	1,091,655	65,703	1.13 (1.05-1.21)
綜合維生素	4	348,954	4,443	1.14 (0.98-1.33)
酒精	29	1,934,957	-	1.20 (1.10-1.30)
乳製品	24	739,672	33,998	1.22 (1.12-1.34)
紅肉	14	974,550	57,630	1.60 (1.22-2.10)



營養因子類別

維生素 A、C、D、E、K　抗氧化劑　發酵食品與益生菌　飲食模式　其他
B 群維生素　礦物質與微量元素　脂肪酸與脂質

RR > 1 = 與前列腺癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 信賴區間下方虛線 = 95% 預測區間（可估計時） | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: Yes