
공격성 전립선암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인
식이 섭취 연구의 메타분석

노출 요인	연구 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 E	2	83,022	355	0.76 (0.29-1.94)
무기질 및 미량 원소				
아연	2	82,482	-	0.84 (0.17-4.29)
과일 및 채소				
토마토	3	124,620	-	0.70 (0.54-0.90)
기타				
총 식이섬유 섭취	2	885,584	5,076	0.86 (0.63-1.17)



노출 요인군
비타민 A, C, D, E, K
무기질 및 미량 원소
과일 및 채소
기타

RR < 1 = 공격성 전립선암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 신뢰구간 아래 점선 = 95% 예측구간 (추정 가능한 경우)

발표된 아형 기저 위험 없음: HR ≈ RR ≈ OR 근사. 누락된 증례 수는 추정하지 않습니다.

Include subexposures: No