
Blootstellingen negatief geassocieerd met het risico op niercelcarcinoom
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Schattingen	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
CAROTENOÏDEN				
Luteïne	5	881,922	4,765	*0.77 (0.68-0.87)*
Zeaxanthine	2	781,129	2,616	*0.79 (0.67-0.93)*
Bètacaroteen	5	881,922	4,765	*0.98 (0.70-1.36)*
VITAMINEN A, C, D, E EN K				
Vitamine E	4	127,855	2,404	*0.67 (0.45-0.99)*
Vitamine C	5	128,222	2,559	*0.76 (0.61-0.94)*
Vitamine D	2	4,112	767	*0.79 (0.65-0.95)*
B-VITAMINEN				
Vitamine B1	2	4,597	1,909	*0.71 (0.55-0.92)*
POLYFENOLEN EN FLAVONOÏDEN				
Thee	4	804,643	2,861	*0.71 (0.51-1.00)*
OVERIG				
Alcohol	21	3,860,985	11,926	*0.72 (0.65-0.79)*
Totale inname van voedingsvezels	2	4,410	1,621	*0.85 (0.64-1.12)*



RR < 1 = negatief geassocieerd met het risico op niercelcarcinoom. | ◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) | ◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) | ◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn onder BI = 95%-voorspellingsinterval (indien beschikbaar) | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen

Include subexposures: No