
与前列腺癌（排除仅侵袭性癌证据）风险呈正相关的营养因子

营养因子	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
叶黄素	5	3,128	1,292	1.00 (0.63-1.61)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 D	26	547,664	63,207	1.14 (1.08-1.20)
维生素 A	13	70,012	17,837	1.15 (0.93-1.42)
B 族维生素				
叶酸	9	91,771	19,124	1.03 (0.96-1.11)
维生素 B12	5	5,961	2,681	1.12 (0.97-1.28)
抗氧化剂				
抗氧化剂	3	56,601	7,271	1.15 (0.87-1.50)
辅酶 Q10	3	36,416	2,065	1.19 (0.79-1.79)
矿物质与微量元素				
铜	2	43,360	6,174	1.05 (1.00-1.11)
铁	5	184,031	11,578	1.05 (0.94-1.16)
镁	2	43,795	6,400	1.06 (1.01-1.11)
锌	11	49,478	6,840	1.13 (0.85-1.50)
钙	24	951,593	55,176	1.14 (1.06-1.23)
发酵食品与益生菌				
酸奶	3	201,324	7,680	1.25 (1.00-1.56)
发酵食品	3	3,460	339	1.37 (0.76-2.45)
脂肪酸与脂质				
二十二碳五烯酸（ω-3）	2	143,344	7,412	1.00 (0.97-1.03)
Omega-3 脂肪酸	9	387,296	22,161	1.01 (0.95-1.09)
α-亚麻酸	5	173,827	9,647	1.15 (0.92-1.43)
多不饱和脂肪（PUFA）	4	63,751	6,186	1.24 (0.77-2.02)
单不饱和脂肪（MUFA）	5	54,581	6,001	1.46 (1.14-1.86)
代谢物与氨基酸				
氨基葡萄糖	3	265,129	16,136	1.06 (1.01-1.11)
胆碱	2	8,123	1,372	1.18 (0.83-1.67)
饮食模式				
西方膳食模式	2	44,462	1,702	1.35 (1.00-1.82)
其他				
复合维生素	4	54,340	5,633	1.01 (0.97-1.04)
超加工食品摄入量	6	248,736	13,760	1.02 (0.95-1.10)
加工肉类摄入量	8	1,089,615	64,702	1.09 (1.02-1.17)
全谷物摄入量	3	79,458	7,209	1.11 (0.97-1.26)
酒精	27	1,911,711	47,035	1.20 (1.10-1.31)
乳制品	23	688,143	33,749	1.22 (1.11-1.34)
红肉	10	873,126	56,254	1.60 (1.15-2.23)



营养因子类别

类胡萝卜素 · 维生素 A、C、D、E、K · B 族维生素 · 抗氧化剂 · 矿物质与微量元素 · 发酵食品与益生菌 · 脂肪酸与脂质 · 代谢物与氨基酸 · 饮食模式 · 其他

RR > 1 = 与前列腺癌（排除仅侵袭性癌证据）风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 置信区间下方虚线 = 95% 预测区间（可估计时） | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No