
與腎臟及腎盂癌風險呈正相關的營養因子

營養因子	估計值數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 A	2	4,597	1,909	1.23 (0.53-2.84)
B 群維生素				
維生素 B1	2	4,597	1,909	1.07 (0.51-2.23)
礦物質與微量元素				
銅	2	95,958	353	2.44 (0.43-13.84)
代謝物與胺基酸				
膳食蛋白質攝取量	2	776,349	2,168	1.30 (0.76-2.24)
其他				
含糖飲料攝取量	4	599,592	1,649	1.13 (0.98-1.30)
加工肉類攝取量	6	1,766,660	5,212	1.15 (0.94-1.41)
超加工食品攝取量	3	1,127,884	4,245	1.18 (1.08-1.30)
非營養性甜味劑攝取量	2	115,981	473	1.28 (1.00-1.63)
紅肉	6	1,768,446	5,800	1.43 (1.13-1.82)
乳製品	6	512,230	2,409	1.57 (1.10-2.25)



RR > 1 = 與腎臟及腎盂癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 信賴區間下方虛線 = 95% 預測區間（可估計時） | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊

Include subexposures: No