
與攝護腺癌（排除僅侵襲性癌證據）風險呈正相關的營養因子
膳食攝取研究的統合分析

營養因子	研究數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 A	5	3,207	1,358	1.12 (0.63-1.99)
維生素 D	3	247,791	29,373	1.34 (0.90-2.01)
B 群維生素				
維生素 B12	2	719	245	1.47 (1.02-2.12)
抗氧化劑				
抗氧化劑	2	50,507	7,155	1.08 (0.76-1.54)
礦物質與微量元素				
鐵	4	183,783	11,462	1.02 (0.94-1.10)
硒	10	235,441	18,652	1.02 (0.93-1.12)
鋅	8	47,636	6,169	1.12 (0.86-1.45)
鈣	16	673,101	45,112	1.17 (1.07-1.27)
發酵食品與益生菌				
優格	3	201,324	7,680	1.25 (1.00-1.56)
發酵食品	3	3,460	339	1.37 (0.76-2.45)
脂肪酸與脂質				
α-亞麻酸	3	172,482	9,151	1.13 (0.89-1.44)
單元不飽和脂肪（MUFA）	3	52,677	5,049	1.31 (1.00-1.73)
多元不飽和脂肪（PUFA）	3	62,799	5,710	1.60 (0.97-2.64)
飲食模式				
西方飲食模式	2	44,462	1,702	1.35 (1.00-1.82)
其他				
綜合維生素	2	5,473	2,403	1.02 (0.84-1.25)
超加工食品攝取量	6	248,736	13,760	1.02 (0.95-1.10)
加工肉類攝取量	8	1,089,615	64,702	1.09 (1.02-1.17)
全穀物攝取量	3	79,458	7,209	1.11 (0.97-1.26)
酒精	27	1,911,711	47,035	1.20 (1.10-1.31)
乳製品	23	688,143	33,749	1.22 (1.11-1.34)
紅肉	10	873,126	56,254	1.60 (1.15-2.23)



RR > 1 = 與攝護腺癌（排除僅侵襲性癌證據）風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 信賴區間下方虛線 = 95% 預測區間（可估計時） | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No