
與腎臟及腎盂癌風險呈負相關的營養因子

營養因子	估計值數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
β-胡蘿蔔素	5	881,922	4,765	0.76 (0.64-0.90)
葉黃素	5	881,922	4,765	0.77 (0.68-0.87)
玉米黃素	2	781,129	2,616	0.79 (0.67-0.93)
茄紅素	3	873,444	2,860	0.84 (0.59-1.22)
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 E	4	127,855	2,404	0.67 (0.45-0.99)
維生素 C	5	128,222	2,559	0.76 (0.61-0.94)
維生素 D	12	584,968	5,299	0.84 (0.65-1.08)
B 群維生素				
維生素 B12	2	1,959	730	0.63 (0.47-0.85)
葉酸	6	84,212	3,088	0.65 (0.47-0.89)
維生素 B6	3	3,861	1,547	0.75 (0.40-1.40)
維生素 B2	3	3,861	1,547	0.84 (0.68-1.04)
礦物質與微量元素				
硒	2	3,471	1,543	0.26 (0.08-0.92)
鈣	4	495,083	1,521	0.85 (0.58-1.25)
多酚與類黃酮				
綠茶	2	103,012	536	0.51 (0.24-1.11)
茶	5	907,106	3,147	0.73 (0.56-0.95)
代謝物與胺基酸				
膽鹼	2	568,979	2,075	0.94 (0.83-1.06)
其他				
酒精	29	14,233,029	30,214	0.77 (0.70-0.84)
總膳食纖維攝取量	3	198,798	2,632	0.87 (0.78-0.97)



RR < 1 = 與腎臟及腎盂癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 信賴區間下方虛線 = 95% 預測區間（可估計時） | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No