
與前列腺癌風險呈負相關的營養因子

營養因子	研究數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
玉米黃素	4	2,106	808	0.66 (0.40-1.08)
茄紅素	20	321,509	28,185	0.85 (0.78-0.93)
β-胡蘿蔔素	15	122,141	-	0.92 (0.76-1.11)
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 K	2	12,063	518	0.73 (0.58-0.92)
維生素 C	11	68,944	7,699	0.87 (0.75-1.03)
維生素 E	25	404,649	36,660	0.94 (0.87-1.02)
B 群維生素				
維生素 B6	3	70,879	7,656	0.89 (0.83-0.96)
礦物質與微量元素				
硒	28	382,643	29,947	0.77 (0.67-0.89)
多酚與類黃酮				
綠茶	7	99,090	1,577	0.62 (0.43-0.89)
茶	10	314,398	15,389	0.75 (0.64-0.89)
水果與蔬菜				
大蒜	3	36,604	2,168	0.69 (0.42-1.13)
番茄	11	1,057,923	67,108	0.74 (0.64-0.85)
豆類	8	1,155,076	79,072	0.89 (0.81-0.97)
脂肪酸與脂質				
亞油酸	7	8,735	3,057	0.71 (0.50-0.99)
油酸	2	58,714	851	0.80 (0.24-2.64)
魚油	2	37,289	1,735	0.89 (0.68-1.17)
二十二碳六烯酸	3	144,141	7,729	0.94 (0.74-1.20)
Omega-6 脂肪酸	2	254,243	1,931	0.96 (0.79-1.17)
二十碳五烯酸	5	444,156	13,552	0.99 (0.89-1.11)
植物雌激素				
黃豆	8	85,059	5,399	0.60 (0.41-0.89)
染料木黃酮	9	91,302	3,818	0.72 (0.54-0.95)
草本與植物製品				
銀杏	2	38,308	1,665	0.93 (0.68-1.27)
代謝物與胺基酸				
膳食蛋白質攝取量	2	109,557	3,064	0.99 (0.89-1.11)
荷爾蒙與內源性物質				
褪黑激素	3	4,618	1,414	0.75 (0.45-1.23)
飲食模式				
植物性飲食	2	211,318	24,516	0.91 (0.84-0.99)
DASH飲食	2	152,714	-	0.93 (0.82-1.06)
其他				
非水溶性膳食纖維攝取量	3	101,084	-	0.62 (0.38-1.03)
水溶性膳食纖維攝取量	3	80,888	10,851	0.89 (0.83-0.96)
總膳食纖維攝取量	7	972,077	64,899	0.92 (0.86-1.00)
雞蛋	3	900,752	53,381	0.99 (0.96-1.02)



營養因子類別

類胡蘿蔔素 · 維生素 A、C、D、E、K · B 群維生素 · 礦物質與微量元素 · 多酚與類黃酮 · 水果與蔬菜 · 脂肪酸與脂質 · 植物雌激素 · 草本與植物製品 · 代謝物與胺基酸 · 荷爾蒙與內源性物質 · 飲食模式 · 其他

RR < 1 = 與前列腺癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 信賴區間下方虛線 = 95% 預測區間（可估計時） | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No