
전립선암 (공격성 암에만 해당하는 근거 제외) 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인
식이 섭취 연구의 메타분석

노출 요인	연구 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
루테인	2	1,623	677	0.65 (0.49-0.86)
베타-카로틴	9	93,912	4,718	0.80 (0.63-1.01)
라이코펜	13	282,888	22,602	0.88 (0.79-0.98)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 C	10	68,446	7,637	0.86 (0.73-1.01)
비타민 E	13	270,107	13,301	0.95 (0.86-1.06)
비타민 B군				
비타민 B6	3	70,879	7,656	0.89 (0.83-0.96)
엽산	4	65,550	6,813	0.91 (0.71-1.16)
폴리페놀 및 플라보노이드				
녹차	6	49,170	1,463	0.64 (0.42-0.96)
차	9	264,478	15,275	0.77 (0.65-0.91)
과일 및 채소				
마늘	3	36,604	2,168	0.69 (0.42-1.13)
토마토	11	1,057,923	67,108	0.74 (0.64-0.85)
콩류	8	1,155,076	79,072	0.89 (0.81-0.97)
지방산 및 지질				
에이코사펜타엔산	2	430,507	7,761	0.95 (0.79-1.15)
식물성 에스트로겐				
제니스테인	2	43,907	440	0.54 (0.37-0.80)
대두	8	85,059	5,399	0.60 (0.41-0.89)
허브 및 식물성 제품				
은행나무	2	38,308	1,665	0.93 (0.68-1.27)
대사산물 및 아미노산				
식이 단백질 섭취	2	109,557	3,064	0.99 (0.89-1.11)
식사 패턴				
식물성 식단	2	211,318	24,516	0.91 (0.84-0.99)
기타				
불용성 식이섬유 섭취	2	57,649	6,553	0.68 (0.38-1.23)
수용성 식이섬유 섭취	3	80,888	10,851	0.89 (0.83-0.96)
총 식이섬유 섭취	7	972,077	64,899	0.92 (0.86-1.00)
달걀	3	900,752	53,381	0.99 (0.96-1.02)



RR < 1 = 전립선암 (공격성 암에만 해당하는 근거 제외) 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 신뢰구간 아래 점선 = 95% 예측구간 (추정 가능한 경우)

Include subexposures: Yes