
방광암 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인
식이 섭취 연구의 메타분석

노출 요인	추정치 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
라이코펜	2	222,535	1,249	1.05 (0.87–1.28)
비타민 B군				
비타민 B1	3	575,001	3,737	1.03 (0.88–1.20)
무기질 및 미량 원소				
칼슘	3	493,396	1,881	1.17 (0.83–1.64)
기타				
초가공식품 섭취	2	647,537	1,906	1.07 (0.91–1.26)
가공육 섭취	8	939,835	6,986	1.10 (0.99–1.22)
붉은 고기	9	1,417,360	6,876	1.32 (1.11–1.57)
달걀	2	1,995	355	3.86 (2.65–5.62)



노출 요인군
카로티노이드 비타민 B군 무기질 및 미량 원소 기타

RR > 1 = 방광암 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 신뢰구간 아래 점선 = 95% 예측구간 (추정 가능한 경우) | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Latest publication per cohort

Include subexposures: No