
与前列腺癌风险呈正相关的营养因子

营养因子	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
叶黄素	5	3,128	1,292	1.00 (0.63-1.61)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 D	24	545,005	-	1.11 (1.04-1.17)
维生素 A	13	70,012	17,837	1.15 (0.93-1.42)
B 族维生素				
叶酸	10	157,607	-	1.02 (0.95-1.10)
维生素 B12	5	5,961	2,681	1.12 (0.97-1.28)
抗氧化剂				
抗氧化剂	3	56,601	7,271	1.15 (0.87-1.50)
辅酶 Q10	3	36,416	2,065	1.19 (0.79-1.79)
矿物质与微量元素				
铜	2	43,360	6,174	1.05 (1.00-1.11)
铁	5	184,031	11,578	1.05 (0.94-1.16)
镁	3	44,056	6,498	1.05 (0.88-1.25)
钙	26	953,511	-	1.15 (1.07-1.24)
锌	12	96,718	7,983	1.18 (0.90-1.54)
矿物质补充剂	2	57,251	1,958	1.33 (0.79-2.26)
发酵食品与益生菌				
酸奶	3	201,324	7,680	1.25 (1.00-1.56)
发酵食品	3	3,460	339	1.37 (0.76-2.45)
脂肪酸与脂质				
二十二碳五烯酸（ω-3）	2	143,344	7,412	1.00 (0.97-1.03)
Omega-3 脂肪酸	10	435,151	22,287	1.03 (0.95-1.11)
α-亚麻酸	8	557,816	13,151	1.31 (1.08-1.58)
多不饱和脂肪（PUFA）	5	64,788	-	1.37 (0.87-2.17)
单不饱和脂肪（MUFA）	6	55,863	-	1.51 (1.17-1.94)
代谢物与氨基酸				
氨基葡萄糖	3	265,129	16,136	1.06 (1.01-1.11)
甜菜碱	2	48,588	868	1.30 (0.73-2.32)
胆碱	3	8,815	1,545	1.38 (0.92-2.07)
饮食模式				
地中海饮食	2	106,146	7,476	1.00 (0.90-1.11)
西方膳食模式	2	44,462	1,702	1.35 (1.00-1.82)
其他				
复合维生素	6	397,821	7,673	1.02 (0.96-1.09)
超加工食品摄入量	6	248,736	13,760	1.02 (0.95-1.10)
全谷物摄入量	3	79,458	7,209	1.11 (0.97-1.26)
加工肉类摄入量	10	1,091,655	65,703	1.13 (1.05-1.21)
酒精	27	1,849,871	-	1.20 (1.10-1.31)
乳制品	22	576,536	30,259	1.22 (1.11-1.35)
红肉	13	926,695	57,504	1.56 (1.18-2.05)



营养因子类别

类胡萝卜素 · 维生素 A、C、D、E、K · B 族维生素 · 抗氧化剂 · 矿物质与微量元素 · 发酵食品与益生菌 · 脂肪酸与脂质 · 代谢物与氨基酸 · 饮食模式 · 其他

RR > 1 = 与前列腺癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 置信区间下方虚线 = 95% 预测区间（可估计时） | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Latest publication per cohort

Include subexposures: No