
与前列腺癌（排除仅侵袭性癌证据）风险呈正相关的营养因子膳食摄入研究的荟萃分析

营养因子	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 A	5	3,207	1,358	1.12 (0.63-1.99)
维生素 D	3	247,791	29,373	1.34 (0.90-2.01)
B 族维生素				
维生素 B12	2	719	245	1.47 (1.02-2.12)
抗氧化剂				
抗氧化剂	2	50,507	7,155	1.08 (0.76-1.54)
矿物质与微量元素				
硒	9	199,908	18,220	1.01 (0.91-1.13)
铁	4	183,783	11,462	1.02 (0.94-1.10)
锌	8	47,636	6,169	1.12 (0.86-1.45)
钙	16	673,101	45,112	1.17 (1.07-1.27)
发酵食品与益生菌				
酸奶	3	201,324	7,680	1.25 (1.00-1.56)
发酵食品	3	3,460	339	1.37 (0.76-2.45)
脂肪酸与脂质				
α-亚麻酸	3	172,482	9,151	1.13 (0.89-1.44)
单不饱和脂肪（MUFA）	3	52,677	5,049	1.31 (1.00-1.73)
多不饱和脂肪（PUFA）	3	62,799	5,710	1.60 (0.97-2.64)
饮食模式				
西方膳食模式	2	44,462	1,702	1.35 (1.00-1.82)
其他				
复合维生素	2	5,473	2,403	1.02 (0.84-1.25)
超加工食品摄入量	6	248,736	13,760	1.02 (0.95-1.10)
加工肉类摄入量	8	1,089,615	64,702	1.09 (1.02-1.17)
全谷物摄入量	3	79,458	7,209	1.11 (0.97-1.26)
酒精	25	1,826,625	45,206	1.20 (1.10-1.31)
乳制品	21	525,007	30,010	1.22 (1.10-1.34)
红肉	10	873,126	56,254	1.60 (1.15-2.23)



营养因子类别

维生素 A、C、D、E、K　抗氧化剂　发酵食品与益生菌　饮食模式　其他

B 族维生素　矿物质与微量元素　脂肪酸与脂质

RR > 1 = 与前列腺癌（排除仅侵袭性癌证据）风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 置信区间下方虚线 = 95% 预测区间（可估计时） | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Latest publication per cohort

Include subexposures: No